



STURZ



Risikofaktoren Sturz

- Sturz in der Anamnese
- Sedierende/verhaltensbeeinflussende Medikamente
- Höhere Anzahl Tage seit Eintritt
- Alter > 75 Jahre

Sturzrate im Spital




Verletzungsrate



- 35.2%** Gesamt
201 / 571
- 21.0%** Minimale Verletzungen
120 / 571
- 6.3%** Mittlere Verletzungen
36 / 571
- 7.9%** Schwere Verletzungen
45 / 571




Nosokomiale Dekubitusprävalenz



Kategorie ≥ 2:
2.3%
286 / 12'460



Kategorie ≥ 2:
6.4%
261 / 4'079



Nosokomiale Dekubitus

gemäss EPUAP-Klassifikation (n=652)*

- 60.6%** Kategorie 1
- 30.1%** Kategorie 2
- 4.6%** Kategorie 3
- 0.9%** Kategorie 4

1.6% Keiner Kategorie zuordenbar:
Tiefe unbekannt

2.2% Vermutete tiefe Gewebschädigung:
Tiefe unbekannt

*Die Anzahl nosokomialer Dekubitus ist höher als die Anzahl Patient/innen mit nosokomialen Dekubitus (Prävalenz), da einige Patient/innen mehr als einen nosokomialen Dekubitus hatten.



Risikofaktoren Dekubitus

- Dekubitusrisiko gemäss subjektiver klinischer Einschätzung der Pflegefachperson
- Völlige Pflegeabhängigkeit
- Höhere Anzahl Tage seit Eintritt
- Operation in den vergangenen zwei Wochen